

尿酸降下薬トピロリック®錠・ユリス®錠の服用方法(目安)

少ない量から飲み始めて、徐々に飲む量を増やしていきます

尿酸が作られるのを抑える1日2回のお薬

トピロリック®錠



腎臓での尿酸の再吸収を抑え、排泄を促す1日1回のお薬


ユリス®錠



時期

投与開始 2週間以降 6週間以降

投与量の目安




錠剤写真: 実物大

時期

投与開始 2週間以降 6週間以降

投与量の目安




錠剤写真: 実物大


トピロリック[®]錠は尿酸が作られるのを抑え、 ユリス[®]錠は腎臓での尿酸の再吸収を抑え、排泄を促します

トピロリック[®]錠

尿酸生成抑制薬




尿酸プールの値は成人男性の値を示す



ユリス[®]錠

選択的尿酸再吸収阻害薬 SURI (Selective Urate Reabsorption Inhibitor)

尿酸がからだの中に再び取り込まれてしまうのを抑える (尿への排泄を増やす)



トピロリック社内資料：アルデヒドオキシダーゼ及びプリン・ピリミジン代謝酵素阻害試験
トピロリック社内資料：XOR阻害作用
ユリス社内資料：ヒトABCG2、OAT1及びOAT3発現細胞を用いた尿酸取り込み阻害試験
Taniguchi, T. et al.: J Pharmacol Exp Ther 371 (1): 162, 2019
本論文の著者のうち、8名は富士薬品、2名は持田製薬の社員である。